

BIGA MVRAENARVM,  
NOVAE SPECIES  
DESCRIPTAE

a

BASILIO ZUIEW.

---

Conuent. exhib. die 11 Octob. 1790.

---

Muraenarum cohortem musaei nostri Academici perlustrans binae mihi in manus cecidere, quarum nulli auctorum neue mentionem factam alicubi inuenio; alteram ob colorem cutis *fuscam*, alteram *albam* appellare libuit: prior conuenit quodammodo cum *M. caeca* Linnaeana, sed maxilla superior longior, nares non tubulosae et non sub rostro sitae, oculique praesentes dissimilare illam iubent familiae caecarum, caeterum auctori ipsi dubiae. Posteriorem quoque ophtis varietatem appellare nequaquam licet, cum corpore sit satis obaeso, immaculato, caudaque non tereti, ut Artaedi memorat, sed Cathetoplatea praedita. Hinc nullus dubito, species hasce, descriptione iconibusque illustratas, pro nouis ac ignotis hucusque in sistema Ichthyologicum prodituras.

Muraena fusca.

Corpoie laeui, tereti, lumbrixi formi; cauda compressa; pinnis dorsali analique in apicem caudae cuspidatum apterygium concurrentibus. Tab. VII. fig. 1.

Di-

Dimensions  
Secundum pedem Parisinum.

		poll. lin.
Longitudo totius piscis ab apice rostri ad extremum		
caudae	- - - - -	11. 8.
— ab apice rostri ad oculos	- - - - -	- 2.
— — — ad angulos oris	- - - - -	- 6.
— — — ad nucham	- - - - -	- 8.
— — — ad exordium pinnae dorsis	- - - - -	1. 5.
— — — — — ani	- - - - -	5. 2.
— — — ad aperturas branchiarum	- - - - -	1. 1.
— — — ad anum	- - - - -	5. 1.
— Maxillae superioris p[re]a inferiore	- - - - -	- 1.
Circumferentia rostri ad oculos	- - - - -	4.
— — — capitidis ad nucham	- - - - -	8.
— — — trunci vbique aequalis, fed hic paulo		
post aperturas sumta	- - - - -	10.
Longitudo pinnae dorsalis	- - - - -	9. 3.
— — — analis	- - - - -	5. 5.
— ab ano ad extremum caudae	- - - - -	6. 6.

Descriptio.

*Corpus cylindricum, alepidotum, lubricum, extremitate altera conica, altera compresso-cuspidata. Caput subrotundum, descendens a nucha et gula sensim in rostrum elongato-acuminatum, conicum, orbitarum elevationibus solis parum eminentioribus, caeterum respectu longitudinis totius corporis parvum, tectum cute glaberrima. Rictus oris horizontalis, ad verticem usque capitidis fissus, angustus. Rostrum a vertice ad extremum apicem adtenuatum, plus quam post medium tantillum ob orbitas oculorum eleuatum, postea acuminatum. Man-*

*Noua Acta Acad. Imp. Sc. T. VII.* P p di

*dibulae* porrectae, cute communi tectae, longitudinaliter bis tere rugosae, rugis a latere labia fere tenuiora aemulantibus, antrorsumque in apicem carnosum conicum definentibus; superiore mandibula longiore, apice carnoso supra glaberrimo, infra bilabiato, naribus ad latera rotundis minimis terminata; inferiore mobiliore; cirri ad vtrumque latus labiorum superiorum bini, cutanei, pupilliformes, alter sub oculis paulo maior, alter aduersus apicem mandibulae inferioris, vel potius ad nares, paulo minor praecedenti, ambo tot quasi dentes caninos ab vtroque latere repraesentantes. *Lentes* in vtraque maxilla minimi, acutissimi, conici, fixi, aequales, exceptis quatuor ad apicem maxillae inferioris caeteris parum maioribus, omnes versus gulam spectantes; *Palatum* ordine similium dentium paulo grossiorum, inter se parallelum longitudinaliter ornatum. *Lingua* acuta, medio profunde sulcata, maxillis annexa. *Nares* ad latera apicis carnosae rostri exiguae, rotundae, limbo molliculo circumuallatae. *Oculi* ad suprema latera rostri, vbi medium eiusdem ob vicinitatem orbitarum eleuatius sentitur, ova-to-oblongi, minimi, cute communi tecti, ita vt vix, nisi orbitarum marginibus eleuatis, vtrum praesint, discernantur. *Opercula branchialia* cutanea, infra supraque corpori adnata, minima, subarcuata, radiis per cutem tenacem vix transparentibus; *Aperturis* infra gulam hiantibus, semilunaribus, membrana intus duplicatis, patentibus. *Nucha* gibbosa, vnâ cum gula protuberante facit partem toto corpore crastorem. *Branchiae* infra nucham vicinae, operculis cutaneis omnino tectae. *Dorsum*, *thorax*, *abdomen*, *latera* ad anum vsque teretia, cute tenaci, nuda, lubrica tecta. *Linea lateralis* papillis cutaneis insignis, ad latera occipitis inchoans, sensim ad nucham gibbosam incurvata, postea dorso parallela eidemque proxima rectissime tendit ad initium pinnae subcaudalis, at vltro sensim sensimque descendendo per vltimam caudam fit media, papillis cutaneis vbiue nota-

notabilis, caeterum glabra. *Anus* inter Caput et Caudae apicem fere medius, aut priori propior. *Cauda* respectu caeteri corporis magis complanata, supra infraque fere carinata. *Pinnæ simplices*, radiatae; *Dorsalis* incipit paulo post aperturas branchiarum, perque omnem dorsi longitudinem ad apicem usque caudae aequaliter tendens extra sulcum dorsi vix conspicua. *Pinna ani* paulo evidentior dorsali, excurrit secundum integrum caudae longitudinem, atque in apice apterygio, ceu limbum exilem formans, coalescit cum dorsali. *Cutis* tenax, laevis, fusca per integrum corpus. *Habitus* macer.

### Muraena alba.

Corpore serpentiformi, glaberrimo, nudo, albo; cauda compresso-cuspidata, limbo cutaneo marginata. Tab. VII. fig. 2.

### Dimensiones.

Longitudo totius corporis ab apice rostri	ped.	poll.	lin.
ad extremum caudae	-	-	9.
— ab apice rostri ad medium oculum	-	-	4.
— — — ad nares	-	-	4.
— — — ad angulos oris	-	-	7.
— maxillæ superioris ad muham	-	-	3.
— — inferioris ad angulos oris	-	-	6.
— — — ad apertur. branch.	-	-	6.
Altitudo rictus diductis mandibulis	-	-	5.
Distantia inter oculos	-	-	3½.
— inter nares	-	-	1½.
Latitudo maxillæ superioris ad oculos	-	-	6.
Altitudo rostri ad oculos maxillis clausis	-	-	3½.
Latitudo capitis maxima	-	-	8.
Altitudo eiusdem summa	-	-	7.
P p 2			Cir-

					ped.	poll.	lin.
Circumferentia capitis ad nucham	-	-	-	-	2.		
Latitudo maxillae inferioris ad oculos	-	-	-	-	4.		
— — — — ad angulos oris	-	-	-	-	6.		
Ab apice maxillae inferioris ad anum	-	-	1.	1.	3.		
Ab ano ad extimum apicem caudae	-	-	-	-	5.	8.	
Ab apice rostri ad exordium pinnae dors.	-	-	-	11.	3.		
Altitudo caudae infra anum	-	-	-	-	—	7.	
Crassities in eodem loco	-	-	-	-	—	5.	
Circumferentia trunci vbiq[ue] aequalis	-	-	-	-	2.	1.	
Apertura ani per longitudinem et transuersim	-	-	-	-	—	2 $\frac{1}{2}$ .	
Apertura branchialis	-	-	-	-	—	—	2.

### Descriptio.

*Corpus cylindricum, nudum, cute alba glaberrima tectum, extremitate altera ouato - depressa, altera compresso - lanceolata. Caput ouato - oblongum, a summo vertice ad rostrum descendens, infra planum, crassitie reliquo corpori aequale. Rictus oris transuersus, mediocris. Rostrum breve, declive, obtusiusculum; maxillis subplagio - plateis, labiatis, inaequalibus, superiore longiore; labiis, superiore sursum, inferiore quasi duplicato deorsum reflexis, carnosis, crassiusculis, intus ordine papillarum cutanearum ceu dentibus circumdatis. Dentes in utraque maxilla et palato plurium ordinum, minimi, acerosi, aequales, in palato obtusiores, fixi. Lingua integra, carnosa, obtusiuscula, libera, glabra, palato vaginata; Palatum fornicatum, in medio glabrum, lateribus maxillis parallelis eleuatis, denticulatis. Nares supra oculos distinctae, ouales, sursum patentes, solitariae, paruae. Oculi in anteriore capitinis parte sive ad basin rostri sub ipsis naribus siti, mediocres, conuexiusculi, nigri, subrotundi, orbita ouali, cute communi tecti, pupilla argentea mi-*

minima nictitantes. *Apertura branchialis* vnica, sub gula in formam ferri equini formata, membrana branchiali per integrum gulam expansa fere operata. *Gula* plana. *Thorax*, *Dorsum*, *lateralia*, *abdomen* teretia. *Linea lateralis recta*, ad caput eleuator, caeterum per totum corpus media, laevissima. *Anus* sub cauda, a capite remotissimus, semilunaris, amplius, patulus. *Cauda* cathetoplatea, cuspidata, apterygia, limbo versus extremitatem exilissimo alata. *Pinna dorsalis* membranacea sub extremum dorsi inchoans ad apicem caudae fit euidentior, in apice vero cum subcaudali confluendo fere evanescit. *Pinna subcaudalis* longe ab ano incipit pariter cutanea, magis visibilis euadit ad extremitatem caudae, longe tamen minor altitudine, quam dorsalis. Ambo specimina prostant in collectione Dhalberghiaua.

---